



CUCURBITACEAE NA CHAPADA DO ARARIPE: LEVANTAMENTO POR MEIO DA BASE DE DADOS SPECIESLINK

**Maria Amanda Nobre Lisboa¹, Eduardo Sampaio de Sousa Tavares Barreto¹, Roniely
Alencar Alves¹, Gabriel Venâncio Cruz¹, João Tavares Calixto Junior²**

Resumo

A família Cucurbitaceae abrange cerca de 1000 espécies distribuídas em 140 gêneros, principalmente nas regiões tropicais do mundo. São plantas eudicotiledôneas, de haste rastejante, rupículas ou terrícolas, frequentemente com gavinhas de sustentação, sendo que vários representantes são espécies domesticadas com grande importância econômica e medicinal, sendo utilizadas na produção de alimentos, fibras e fitoterápicos. Neste trabalho foi utilizado como metodologia de levantamento florístico a base de dados specieslink, onde observou-se a ocorrência de espécies encontradas e identificadas como ocorrentes na Chapada do Araripe, ao Sul do Estado do Ceará. Foram identificados sete gêneros: *Cayaponia*, *Momordica*, *Luffa*, *Psiguria*, *Apodanthera*, *Echinocystis* e *Perianthopodus*. As espécies com maior número de registros foram: *Psiguria ternata* (4 registros) e *Momordica charantia* (3 registros). *Cayaponia racemosa*, *Luffa cylindrica*, *Psiguria umbrosa*, *Apodanthera congestiflora*, *Cayaponia tayuya*, *Echinocystis muricata* e *Perianthopodus espelina* foram as demais espécies com registros. Faz-se de extrema importância a realização de trabalhos mais detalhados de levantamento florístico na Chapada do Araripe, tendo em vista a família Cucurbitaceae, para assim, ter-se maior embasamento da riqueza da flora nativa e da preservação das espécies de potencial econômico, fitoterápico e ornamental.

Palavras-chave: Chapada do Araripe, Levantamento Florístico, Cucurbitaceae.

¹ Graduando do curso de Ciências Biológicas da Universidade Regional do Cariri – URCA;

² Docente do Departamento de Ciências Biológicas na Universidade Regional do Cariri – URCA

*Amandanobrelisboa10@gmail.com