



OCORRÊNCIA DE ANACARDIACEAE EM CRATO, SUL DO CEARÁ

Luana Maria Alencar de Luna^{1*}; Maria Amanda Nobre Lisboa¹, Eduardo Sampaio de Sousa Tavares Barreto¹, Roniely Alencar Alves¹, João Tavares Calixto Júnior²

Resumo

A família Anacardiaceae é representada por árvores ou arbustos geralmente com canais resinosos que, quando expostos a injúrias, apresentam odor característico. Muitas das substâncias encontradas em representantes desse grupo são úteis em tratamentos terapêuticos, assim como são de grande importância econômica. Anacardiaceae é composta por cerca de 70 gêneros e 700 espécies, ocorrendo no Brasil, cerca de 70 dessas espécies, distribuídas em 15 gêneros. Destas, espécies frutíferas com alto potencial econômico (gêneros *Mangifera*, *Spondias* e *Anacardium*). Neste trabalho, realizou-se o levantamento florístico da família Anacardiaceae ocorrente no município de Crato (Chapada do Araripe e zona urbana do município), Sul do Ceará, apoiando-se na base de dados *SpeciesLink*. Constatou-se a ocorrência de 16 espécies em 110 registros distribuídos em seis gêneros: *Anacardium*, *Astronium*, *Mangifera*, *Myracrodruon*, *Spondias* e *Tapirira*, sendo que os gêneros *Spondias* e *Anacardium* foram os que apresentaram maior número de ocorrências (três espécies cada). As espécies *Anacardium occidentale* e *Anacardium microcarpum* apresentaram os maiores números de registros (31 e 24 registros respectivamente). Por meio dos trabalhos de levantamento florístico pode-se ter uma maior percepção da representatividade da diversidade de espécies existentes na Chapada do Araripe e zona urbana do município do Crato, explorando assim, conscientemente, todos os recursos disponíveis para a agregação de novos conhecimentos.

Palavras-chave: Anacardiaceae. Chapada do Araripe. Levantamento florístico.

¹Graduando do curso de Ciências Biológicas da Universidade Regional do Cariri – URCA;

²Orientador, Docente do Departamento de Ciências Biológicas – DCBio/URCA.

* luannaluna0@gmail.com