

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE

IMPACTO DA AMPUTAÇÃO DO PÉ DIABÉTICO NO MUNDO

Ellyan Victor Ferreira dos Santos¹

Tatiana Indiana da Silva²

Karolayne Carvalho Silva³

Matheus Emanuel Souza Araújo Vieira⁴

Joel Azevedo de Menezes Neto⁵

Diabetes Mellitus é uma patologia crônica crescente, manifestando-se como um grave problema de saúde pública, devido a sua alta prevalência e incidência no mundo. Inicialmente é caracterizado pela infecção, ulceração e destruição dos tecidos. A presença de úlcera é a causa da grande morbidade, mortalidade e alto custo afetando anualmente cerca de 26 milhões de pessoas no mundo. Sem os cuidados necessários, úlceras podem levar a hospitalização, amputação e morte. Assim, a cicatrização da úlcera no PD é de suma importância globalmente. Com isso, objetivou-se identificar na literatura científica os impactos que as amputações do PD apresentam para o mundo. É uma revisão bibliográfica, onde o levantamento foi realizado nas bases de dados da LILACS, PUBMED, e na Biblioteca virtual de saúde-BVS, onde foi coletado artigos entre os anos de 2016 à 2020. Utilizando os Descritores (DeSC) e o acrônimo PCC onde P: Diabéticos, C: Impacto pela amputação do PD, C: Amputação dos membros inferiores e foi formulado a pergunta norteadora: Quais as evidências da literatura científica contextualizam à respeito do impacto do PD no mundo?; Foram incluídos artigos completos, com aderência ao estudo, nos idiomas português e inglês. Foram excluídos artigos que não cumpriram os critérios supracitados. Foram analisados 8 artigos completos, sendo selecionados 5 artigos que compuseram a amostra final. Os estudos mostram que os custos da saúde são cinco vezes maiores em indivíduos com diabetes e úlceras no pé, quando comparados com a ausência de úlceras, se tornando uma preocupação mundial. Esses custos estão principalmente relacionados às hospitalizações, o tratamento e acompanhamento de pacientes ambulatoriais. A prevalência de úlceras nos pés atinge boa parte das pessoas diabéticas, e majoritariamente, as amputações não traumáticas acontecem nesses pacientes. Os cuidados devem ser redobrados, demandando mais tempo da equipe, e atenção da família para o paciente, com o propósito de uma cicatrização eficaz, prevenção de novas úlceras e consequentemente uma segunda amputação. Pois, a perda e impossibilidade de reabilitação social afeta diretamente a vida do indivíduo. Verificou-se que o impacto mundial está relacionado aos custos financeiros, repercutindo também o impacto psicológico. Concluindo que esse processo está associado com elevada morbidade, mortalidade e custos significativos para os pacientes, suas famílias e a sociedade.

DESCRITORES: Diabetes Mellitus; Complicações do diabetes; Pé Diabético; Amputação.

¹Acadêmico do Curso de Enfermagem da Faculdade UNINASSAU/ Caruaru- PE, Brasil;
(ellyan_victor@gmail.com)

²Acadêmica do Curso de Enfermagem da Faculdade UNINASSAU/Caruaru-PE, Brasil;
(tatianaindiana10@gmail.com)

³Acadêmico do Curso de Enfermagem da Faculdade UNINASSAU/ Caruaru- PE, Brasil;
(karol166carvalho@gmail.com)

⁴Acadêmico do Curso de Enfermagem da Faculdade UNINASSAU/ Caruaru- PE, Brasil;
(matheusvieira.7@outlook.com)

⁵Enfermeiro-AEB/FBJ-PE. Hospital Regional Dom Moura – SES-PE. Albert Einstein Instituto Israelita e Ensino e pesquisa/SP; Docente do Curso de Enfermagem da Faculdade UNINASSAU/ Caruaru-PE, Brasil (Prof.Joelnetto@gmail.com)