



Ecologia e distribuição geográfica do Gato-do-mato (*Leopardus tigrinus*)

Cícera Ruth de Souza Machado¹ Francisco Walison dos Santos Machi² Fernanda Oliveira Modesto³ Huanderson de Lima Souza⁴ Gabriela Paise⁵

Resumo

O Gato-do-mato (*Leopardus tigrinus*) é um felino de porte mediano, com 60 a 85 cm de comprimento e peso de 1,5 a 3,5 kg. O objetivo deste estudo é fazer uma pesquisa bibliográfica buscando dados sobre ecologia, distribuição geográfica e categoria de ameaça da espécie. O Gato-do-mato alimenta-se de pequenos mamíferos, aves e répteis. Sua área de vida, ainda pouco conhecida, consta de 1 a 25 km². O modo de vida é solitário, a atividade é noturna com início ao entardecer e fim ao amanhecer. A gestação é de 73 a 78 dias, nascendo de 1 a 3 filhotes. No Brasil ocorre nos biomas Amazônia e Caatinga. Ocorre em todo o Nordeste e no Ceará, em 11 municípios, em área de florestas, Carrasco, Cerrado e Caatinga. Está classificada como Vulnerável na IUCN e como Em Perigo na Lista de Espécies Ameaçadas do Brasil. Suas grandes ameaças são a perda de habitat natural, caça e atropelamentos. Tais ameaças causam declive populacional da espécie, que pode desaparecer em alguns locais. Ações de conservação são vitais, tais como construção de passagens de fauna em rodovias, fiscalização, proteção de seu ecossistema e supervisão das populações naturais.

Palavras-chave: Ceará. Felinos. Categoria de Ameaça. Conservação.

¹ Graduanda do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas; Universidade Regional do Cariri;

² Graduando do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Universidade Regional do Cariri;

³ Graduanda do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas; Universidade Regional do Cariri;

⁴ Graduando do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Universidade Regional do Cariri;

⁵ Orientadora, Docente do Departamento de Ciências Biológicas – DCBio/URCA.